

Metástase de Carcinoma Epidermóide Cutâneo para Intestino Delgado: Relato de um caso com Suboclusão Intestinal

Romulo Joventino Coelho¹; Gabriel Reis Olej²; Jeferson Cavalcante Ribeiro²; João Vitor Della Torre Soler²; Asterio Pinto do Monte Filho³; Juliana Ominelli⁴; Jessica Germania Lema Tayupanda⁵.

¹UFF, Niterói - RJ - Brasil; Instituto de Pós Graduação Carlos Chagas, Rio de Janeiro - RJ - Brasil

²UFF, Niterói - RJ - Brasil. ³Consultório particular, Rio de Janeiro - RJ - Brasil. ⁴DASA oncologia, Rio de Janeiro - RJ - Brasil. ⁵Instituto de Pós Graduação Carlos Chagas, Rio de Janeiro - RJ - Brasil.

E-mail para contato: gabrielolej@gmail.com

Introdução: Apesar dos tumores malignos do intestino delgado representarem apenas cerca de 3–4% das neoplasias do trato gastrointestinal, observa-se aumento progressivo de sua incidência e diversidade histológica. Os tipos mais comuns incluem adenocarcinomas, tumores neuroendócrinos e estromais (GISTs). O carcinoma espinocelular (CEC), por outro lado, é extremamente raro nessa topografia, sendo mais frequente na pele, esôfago, faringe e canal anal.

Relato de Caso: Paciente masculino, com histórico de ressecção de múltiplas lesões cutâneas, incluindo CEC, procurou emergência por dispepsia associada à alimentação sólida há 2 meses, além de episódios de êmese. A tomografia computadorizada revelou obstrução intestinal alta, com espessamento jejunal e distensão do jejuno proximal, duodeno e estômago. Laparoscopia evidenciou lesão parietal em jejuno proximal. Realizou-se enterectomia segmentar com ressecção da área estenosante e anastomose primária. O anatomopatológico revelou CEC infiltrando a parede jejunal, sem linfonodos comprometidos (pT4N0). O pós-operatório foi favorável. Dois meses após, PET-CT mostrou formação tecidual pleural/subpleural basal esquerda hipermetabólica com invasão óssea do 12º arco costal (SUVmax 4,4), focopleural adicional e opacidade espiculada pulmonar. Diagnosticado CEC metastático, iniciou-se imunoterapia com pembrolizumabe, que resultou em significativa redução da lesão pleural e estabilização óssea, sem novas metástases após dois meses — resposta parcial ao tratamento.

Discussão: A presença de CEC no intestino delgado é rara e geralmente corresponde a metástase de sítios primários extragastrointestinais. O histórico de lesões cutâneas ressecadas reforça essa hipótese. Como os sintomas são inespecíficos — dor abdominal, náuseas, vômitos e obstrução — o diagnóstico costuma ocorrer em fases avançadas. Métodos de imagem convencionais podem falhar na detecção precoce, sendo o PET/CT com FDG e a endoscopia por cápsula úteis na avaliação de metástases intestinais. O tratamento geralmente combina ressecção cirúrgica e terapias sistêmicas, como imunoterapia. A escolha terapêutica depende do tipo histológico e do perfil molecular da neoplasia. Neste caso, o uso de pembrolizumabe mostrou-se eficaz a curto prazo.

Conclusão: CEC com comprometimento do intestino delgado é condição rara e frequentemente metastática. O diagnóstico precoce é desafiador, porém essencial para melhorar o prognóstico. Este caso destaca a importância de considerar metástase cutânea em pacientes com história de CEC e sintomas gastrointestinais obstrutivos, além de reforçar o papel da cirurgia e imunoterapia no manejo dessa apresentação incomum.

Referências:

- REYNARD, M. E.; STRATI, T.-M.; EGGER, B. Small intestinal perforation secondary to metastasis from skin squamous cell carcinoma: A case report and literature review. *International Journal of Surgery Case Reports*, v. 109, p. 108599–108599, 1 ago. 2023.
- MUMTAZ, S. et al. Squamous cell carcinoma in the small intestine. *BMJ Case Reports*, v. 2011, n. may10 1, p. bcr0120113762–bcr0120113762, 12 maio 2011.
- PUCCINI, A.; BATTAGLIN, F.; LENZ, H.-J. Management of Advanced Small Bowel Cancer. *Current Treatment Options in Oncology*, v. 19, n. 12, 5 nov. 2018.
- HITCHEN, N. et al. Jejunal perforation: an unusual presentation of metastatic cutaneous squamous cell carcinoma (SCC) in an immunosuppressed patient. *BMJ Case Reports*, p. bcr2016216929–bcr2016216929, 6 jan. 2017.
- LI, R. et al. Metastatic squamous cell carcinoma from hand skin causing small bowel obstruction: an unusual case presentation. *World Journal of Surgical Oncology*, v. 12, n. 1, 28 maio 2014.